



VIRGINIA DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND CONSUMER SERVICES

Procedimiento de limpieza y desinfección a consecuencias de vomito y diarrea

Debido a la naturaleza altamente infecciosa del **Norovirus**, el procedimiento de limpieza y desinfección va de acuerdo con el 2VAC5-585-255. La limpieza de eventos de vomito y diarrea son los siguientes:

Suministros:

Equipo de protección personal (PPE)

- 2 pares de guantes desechables, no latex
- 1 máscara de cara
- 1 bata desechable con manga
- 1 cubierta de pelo desechable
- 1 par de cubierto para los zapatos desechable

Suministros de limpieza

- 1 bolsa plástica o bolsa de riesgo biológico con precinto de amarre
- 1 cuchara / "scraper"
- papel de toalla desechable o polvo absorbente/solidificador
- desinfectante (blanqueador)

Procedimiento de limpieza y desinfección

1. Remover individuo(s) del establecimiento.
2. Restringir el acceso a la zona con artículos como conos o cintas de precaución. Dar acceso solo al empleado designado de la limpieza.
3. El empleado designado debe ponerse el PPE y reunir los suministros de limpieza.
4. Se debe cubrir el derrame con un material absorbente para que absorba todo el líquido.
5. Recoger materiales y ponerlos en una bolsa con precinto de amarre.
6. Aplicar desinfectante a la superficie (tenga contacto con la comida o no) utilizando una toalla desechable o una botella con "spray". Si se utiliza cloro diluido, que sea 1 ½ tazas de blanqueador (5.25%) en un galón de agua y permita un tiempo de contacto de 5 minutos. Recuerde: si este procedimiento es utilizado en una superficie que tiene contacto con alimentos, se necesita lavar, enjuagar y desinfectar la superficie luego de la primera limpieza para remover cualquier residuo.
7. Descartar cualquier producto de comida y artículos desechables que posiblemente estén expuestos a gotas por fluidos corporales a 25 pies del incidente.
8. Desinfectar las herramientas utilizadas en el proceso de limpieza como por ejemplo el mapeo y el cubo.
9. Considerar repetir el proceso de desinfección para asegurar la eliminación de las partículas del Norovirus.
10. Remover PPE antes de irse del área y desechar la bolsa con amarre.
11. Lavarse las manos correctamente y si es posible asearse y cambiarse la ropa.